

Onderhoudstips voor je nieuwe boomgaard

Met de aanplant van je hoogstamfruitbomen is het niet gedaan ...

Het is belangrijk de jonge bomen te helpen in de periode tussen de aanplant en de herneming van hun normale groei (meestal 2 tot 3 jaar na de aanplant).

De voornaamste zorgen dienen in het eerste groeiseizoen, en vooral in het eerste voorjaar en de eerste zomer toegebracht te worden. De daaropvolgende jaren kunnen ze eventueel in mindere mate verdergezet worden.

De grootste vijanden van de jonge boom zijn: droogte, grasmaaiers en dieren. Hierna lees je welke problemen zich kunnen voordoen en hoe je deze kan voorkomen of verhelpen.

Verdroging (= dé nummer 1 doodsoorzaak bij nieuwe aanplantingen)

Herkennen:

- de bladeren gaan slap hangen, worden vervolgens bruin vanaf de rand en verschrompelen
- in een verder stadium gaat ook de schors rimpelen en sterft de twijg af

Voorkomen:

Geef water

- ± 50 liter water per hoogstamfruitboom per keer
- minstens 1 keer per week
- bij voorkeur 's avonds zodat het water de kans krijgt in de bodem te trekken
- maak eventueel een richeltje om te vermijden dat het water wegloopt
- ga door tot na de droogteperiode, het duurt immers een tijdje voordat de regen voldoende diep in de bodem is doorgedrongen

Bedek de bodem

- dek de grond af met een mulchlaag (5 cm of dikker), bij voorkeur van goed verteerde compost of stalmest
- houd de stamvoet vrij (Ø 10 cm)
- heb je last van woelmuizen: bedek de bodem dan enkel van april tot oktober

Houd de boomschijf bloot

- dit vermijdt wortelconcurrentie
- hak daartoe de bovenlaag regelmatig en oppervlakkig (1 à 2 cm). Dit remt verdamping en kieming van zaden.

Verwijder stamscheuten

- scheuten op de stam pikken het vocht in dat de takken en bladeren van de kruin nodig hebben. Verwijder deze stamscheuten gedurende het hele groeiseizoen. Liefst op het ogenblik dat ze nog niet verhout zijn en je ze nog gewoon kan aftrekken. Zijn ze al dikker, snoei ze dan tot tegen de stam af met een snoeischaar.

Snoei

- indien bij de aanplant de plantsnoei niet werd uitgevoerd, of als er toch nog relatief veel blad aanwezig is, kan je de takken alsnog verder inkorten. Let op! Aangezien de plant nu reeds verdrogingsverschijnselen vertoont is het belangrijk de wondjes af te dekken met een wondbeschermingsmiddel om extra verdamping te vermijden.

vervolg z.o.z.

Maaischade

Herkennen:

- rafelige losgekomen schors
- beschadigde stam

Voorkomen:

- plaats 3 lage paaltjes in driehoekvorm op 20 cm van de stam

Vraatschade aan de boom

Herkennen:

- pikschade aan knoppen (vogels)
- afbijten twijgen en schillen van de stam (haas/konijn)
- veegschade aan stam of takken en afbijten van knoppen (ree)
- ondergrondse gangen en afvreten van schors aan wortels en stamvoet (woelmuizen en ratten)

Voorkomen:

- plaats een vogelverschrikker
- plaats een voldoende hoge cilinder van fijnmazige draad rondom de stam of plaats een kunststof beschermspiraal (minder gunstig door donker en vochtig klimaat rond de stam)
- omhein (tijdelijk) het hele perceel
- smeer de stam in met een wildafweermiddel

Vraat- en zuigschade aan bladeren en jonge scheuten

Herkennen:

- onregelmatige gaten in bladeren
- opgekrulde bladeren en misvormingen bij de scheutgroei

Voorkomen:

Bij een beperkte aantasting is bestrijding niet nodig. Bij een zware aantasting in het eerste of tweede groeiseizoen kan de schade echter zo groot zijn dat een ingreep verantwoord is.

- hang met hooi gevulde omgekeerde bloempotjes die je eerst enkele dagen onder een ruige perceels- of haagrand hebt geplaatst in de bomen. De daarin aanwezige oorwormen zullen de plaag bestrijden.
- spuit bladluizen weg met een krachtige waterstraal of bespuit de boom met een oplossing van bruine zeep
- plaats van oktober tot januari lijmbanden rond de stam voor het wegvangen van vrouwelijke wintervlinders

PROFICIAT als je bomen hun eerste groeiseizoen gezond en wel doorkomen!

Let je de daaropvolgende jaren ook nog op volgende zaken, dan komt het normaal allemaal dik in orde:

- geef je boom gedurende de eerste 8 tot 10 jaar een **vormsnoei** tijdens de winter (van half november tot eind maart bij droog maar niet te koud weer).
- knelt de **boombindband** rond de stam of is hij ingegroeid? Maak hem los en maak hem ruimer of vervang hem door een nieuw, groter exemplaar.
- controleer de **bescherming** tegen vee of andere dieren en herstel ze indien nodig.